

Impfung	Empfohlenes Alter	Auffrischimpfung
Rotaviren: führen zu starkem Durchfall und Erbrechen	Bis zu 3 Teilimpfungen im Alter von 6 Wochen bis 4 Monaten	keine
Tetanus	G1: 2 Monate G2: 4 Monate G3: 11 Monate	A1: 5 bis 6 Jahre A2: 9 bis 16 Jahre Ab einem Alter von 18: Auffrischungen alle 10 Jahre
Diphtherie	G1: 2 Monate G2: 4 Monate G3: 11 Monate	A1: 5 bis 6 Jahre A2: 9 bis 16 Jahre Ab einem Alter von 18: Auffrischungen alle 10 Jahre
Keuchusten (Pertussis)	G1: 2 Monate G2: 4 Monate G3: 11 Monate	A1: 5 bis 6 Jahre A2: 9 bis 16 Jahre A3: Ab 18 Jahre
Hib (Haemophilus influenzae Typ b): kann Hirnhaut-, Herzmuskel- und Lungenentzündung sowie Sepsis auslösen	G1: 2 Monate G2: 4 Monate G3: 11 Monate	A1: 5 bis 6 Jahre A2: 9 bis 16 Jahre A3: Ab 18 Jahre
Kinderlähmung (Poliomyelitis)	G1: 2 Monate G2: 4 Monate G3: 11 Monate	A1: 9 bis 16 Jahre
Hepatitis B	G1: 2 Monate G2: 4 Monate G3: 11 Monate	keine
Pneumokokken	G1: 2 Monate G2: 4 Monate G3: 11 Monate S: ab 60 Jahren	keine
Meningokokken	G1: 12 Monate	keine
Masern	G1: 11 Monate G2: 15 Monate S: ab 18 Jahren	keine
Mumps	G1: 11 Monate G2: 15 Monate	keine
Röteln	G1: 11 Monate G2: 15 Monate	keine
Windpocken (Varizellen)	G1: 11 Monate G2: 15 Monate	keine
<u>HPV (Humane Papillomviren)</u>	G1 und G2: 9 bis 14 Jahre	keine
Herpes zoster (Gürtelrose)	G1 und G2: ab 60 Jahren im Abstand von 5 Monaten	keine
Grippe (Influenza)	S: ab 60 Jahren jährlich	keine